

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas.
- Ingestión: hacer que la persona beba a sorbos un vaso de agua si lo puede ingerir. No Inducir al vómito si la persona esta inconsciente ni trate de introducir nada por la boca.
- Contacto con la piel: quite la ropa contaminada a la persona y lave cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15-20 minutos.
- Contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua, durante 15-20 minutos
- Inhalación: retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar bien ventilado. Dar respiración artificial o administrar oxígeno, si fuera necesario.

Nota al médico

- Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106.

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.



Quetin®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin 18 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1378-SENASA

Titular de registro, Importador y Distribuidor:

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby N° 254 Of 306. Santiago de Surco.

Lima - Perú. Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.

Room 10-6, Shidai Square,

N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, China

CONTENIDO NETO: 500 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

QUETIN es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión, con efectiva acción translinar y buena persistencia sobre el follaje. Bloquea la actividad eléctrica en los nervios y músculos de la plaga. Es un modulador alostérico del canal de cloruro dependiente de glutamato (GluCl). Eficaz en el control de los estadios móviles de ácaros, minadores de hojas e insectos picadores- chupadores que atacan a los cultivos que se muestran en el cuadro de uso. Puede ser utilizado en Programas de Manejo Integrado de Plagas

Modo de empleo: QUETIN es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L (días)		
MANDARINO	"Minador de la hoja"	Phyllocnistis citrella	0.08-0.1	7	0.01	
	"Arañita roja de los citrus"	Panonychus citri				
PAPA	"Acaro hialino"	Polyphagotarsonemus latus	0.2-0.24	0.1-0.12	3	0.01
	"Mosca minadora"	Liriomyza huidobrensis	0.32-0.4	0.16-0.2		
SANDÍA	"Arañita bimaclada"	Tetranychus cinnabarinus	0.2-0.24	0.1-0.12	7	0.01

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha-Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se observen los primeros daños o cuando aparezcan los primeros ácaros. Repetir la aplicación en caso necesario con un intervalo de 7 días. Realizar máxima 2 aplicaciones seguidas o 3 alternadas por campaña para los cultivos de mandarina, papa y sandía. Alterne o rote con acaricidas de diferentes grupos químicos.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Presenta fitotoxicidad a helechos *Adiantum* spp. y margaritas *Shasta Leucantherum* spp.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



Dimensiones: 120 mm x 230 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA