

# Quetin®

PLAGUICIDA QUÍMICA DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Abamectin ..... 18 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1L

Reg PQUA N° 1378-SENASA

Titular de Registro,  
**AGRO KLINGE S.A.**  
Calle Rene Descartes 311.  
Urb. Santa Raquel II Etapa. Ate. Lima

 **AgroKlinge**  
a member of ADAMA

Fabricado y Formulado por: **Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square,  
N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang,  
China

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 503.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000



CONTENIDO NETO: **5 Litros**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO**

CARA

Dimensiones: 140 mm x 150 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUJIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Avermectinas.
- Ingestión: hacer que la persona beba a sorbos un vaso de agua si lo puede ingerir. No Inducir al vómito si la persona esta inconsciente ni trate de introducir nada por la boca.
- Contacto con la piel: quite la ropa contaminada a la persona y lave cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15-20 minutos.
- Contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua, durante 15-20 minutos

**Nota al médico**

- Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, AgroKlinge: (01) 612-6565 ESSALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**QUETIN** es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión, con efectiva acción translaminar y buena persistencia sobre el follaje. Eficaz en el control de los estadios móviles de ácaros, minadores de hojas e insectos picadores- chupadores que atacan a los cultivos que se muestran en el cuadro de uso. Puede ser utilizado en Programas de Manejo Integrado de Plagas

**QUETIN** es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
MANDARINO	"Mingdor de la hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	----	0,08-0,1	7	0,01
	"Arañita roja de los cítricos"	<i>Panonychus citri</i>				
PAPA	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0,2-0,24	0,1-0,12	3	0,01
	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,32-0,4	0,16-0,2		
SANDÍA	"Arañita bimaclada"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0,2-0,24	0,1-0,12	7	0,01

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha- Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando se observen los primeros daños o cuando aparezcan los primeros ácaros. Repetir la aplicación en caso necesario con un intervalo de 7 días. Realizar máximo 2 aplicaciones seguidas o 3 alternadas por campaña/cultivo. Alterne o rote con acaricidas de diferentes grupos químicos.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 12 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Presenta fitotoxicidad a helechos *Adiantum* spp. y margaritas *Shasta Leucantherum* spp.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



CONTRACARA