

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Syl®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:
Propineb 700 g/kg
Aditivos: c.s.p. 1 kg
Reg. N° 343 -97-AG-SENASA
Contenido neto: 10 Kilogramos
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000



Fabricado y Formulado por:
Limin Chemical Co., Ltd.
Industrial Development Zone, 221400 Xinyi,
Jiangsu China

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lavela ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Ditiocarbamato
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
 - Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como náuseas, diarrea, vómitos y en algunos casos lipotimia.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: No administrar morfina, leche ni aceite comestibles. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA Agriculture Perú S.A. (01)641-0000.

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SYL es un fungicida preventivo, de contacto, con amplio espectro de acción y largo efecto residual. Se aplica en pulverizaciones dirigidas al follaje previa mezcla con agua con equipos de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		
PAPA	"Hielo" o "Rancha"	Phytophthora infestans	1.5-2.5	0.5 - 1	7	0.2
TOMATE	"Hielo"	Phytophthora infestans	1.5-2	0.5 - 0.75	7	5
	"Tizon temprano"	Alternaria solani				
ALGODONERO	"Cabeza de clavo"	Alternaria tenuissima	1.5-2	0.5 - 0.6	7	3
ZAPALLO	"Mildiu"	Pseudoperonospora cubensis	1.5-2	0.5 - 0.6	7	0.2
MELÓN	"Mancha de la hoja"	Alternaria spp.	1.5-2	0.5 - 0.6	7	0.5 1
SANDÍA						
AJÍ	"Cercosporiasis"	Cercospora capsici	1.5-2	0.5 - 0.6	7	3
HABA	"Mancha de la hoja"	Cercospora zonata	1.5-2	0.5 - 0.6	7	2
NARANJO	"Podredumbre gris/ Moho gris"	Botrytis cinerea	-	0.5 - 0.6	7	2
PÁPRIKA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1-2	0.5 - 0.6	7	1
ESPÁRRAGO	"Cercosporosis" "Mancha púrpura"	Cercospora asparagi Stemphylium vesicarium	-	0.5 - 0.6 0.5 - 1.0	30	0.5
ALCACHOFA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1.0-1.2	0.5 - 0.6	3	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 a 600 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o tan pronto se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación será de 7 a 10 días. Disminuir la frecuencia de aplicación cada 5 días, si las condiciones de temperatura y humedad favorecen el desarrollo del hongo. Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña.
PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD
Incompatible con plaguicidas de reacción alcalina. No aplicar inmediatamente antes o después de haber aplicado productos que contengan cobre.
FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas
RESPONSABILIDAD CIVIL
“El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

