

9.8 cm

THIOSTAR®

PLAGUICIDA AGRÍCOLA DE USO QUÍMICO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

Composición:

Enamectin benzoato..... 50 g/Kg
Aditivos..... csp 1 Kg

Registro PQUA N° 1178- SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ale. Lima-Perú
Telf.: 612-6565
RUC N° 20508704217

Formulado por:
BETA CHEMICALS LTD.
Rm.707, Bld. A, Kingsound Center,
No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Contenido Neto: 100 g

Lote Nro:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

9 cm

14.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:

El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación. No consumir, ni fumar durante las operaciones de aplicación. Mantenga el producto en su envase original.

No almacenar, ni transportar, junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.

Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cambies y lave la ropa contaminada.

No permitir que los animales entren en contacto con la mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.

Este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectina

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, si es necesario, procure la atención médica y hospitalaria.

- En caso de contacto con las ojos, láveslos con abundante agua por 20 minutos.

- En caso de contacto con la piel, quítale la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

- No tiene artículo específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas)

ESALUD EN LINEA: 471-8000 Opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido inutilizado triturándolo o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Prohibido reutilizar el envase para otros fines.

Prohibido el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.

- No aplicar en época de floración.

- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No mezclar con otros productos químicos con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.

- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que los animales entren en contacto con el producto en zonas con napas freáticas superficiales.

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, agitar y simultáneamente echar la cantidad de THIOSTAR, a utilizar. Agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.

THIOSTAR, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda aplicar el producto en un área de 1000 m² de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Nombre Comercial	Nombre Científico	Dosis	PC
Plátano	Enamectin	Avermectina	0.05 g/l (0.05 l/ha)	3
Plátano	Enamectin	Avermectina	0.05 g/l (0.05 l/ha)	3
Plátano	Enamectin	Avermectina	0.05 g/l (0.05 l/ha)	3

PC: Peligro de muerte. LIMA: Límite Máximo de Residuo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estados larvales. Se debe aplicar cuando la temperatura ambiente sea superior a 15°C. No se recomienda la aplicación consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Para reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

© Marca Registrada

