

16.5 cm

12.5 cm

THIOSTAR®

PLAGUICIDA AGRÍCOLA DE USO QUÍMICO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

Composición:

Emamectin benzoato..... 50 g/Kg
Aditivos..... csp 1 Kg

Registro PQUA N° 1178- SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
BETA CHEMICALS LTD.
Rm.707, Blk. A, Kingsound Center
No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Lote Nro:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 100 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1cm

1cm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

•El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
•No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
•No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
•Después, de usar este producto bañese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
•Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
•Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
•Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS:

•Grupo químico: Avermectina
•En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
•En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
•No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
•No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 CICOTOX: (01) 328-7700

AGROKLINGE S.A. (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

•Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
•No aplicar en época de floración.
•Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
•Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.

•Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

•Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

•En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, colar y simultáneamente echar la cantidad de THIOSTAR a utilizar. Agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.

THIOSTAR, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ 200 L	Kg/ha		
Pimiento	*Gusano perforador del fruto	Heliothis virescens	0.09 - 0.10	---	3	0.01
Espárrago	*Gusano defoliador	Heliothis virescens	---	0.2	7	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar THIOSTAR de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

© Marca Registrada



1cm

1cm