

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO. POSIBLE CARCINÓGENO.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de emergencia:  
CICOTOX: (01) 328-7700  
ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4  
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# EXCELSIOR

## 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

Carbendazim..... 500 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2536 - SENASA

Titular de Registro:



INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa,  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove  
Twickenham TW1 1JG  
United Kingdom

Importado y

Distribuido por:



MEXAGRO DEL PERÚ S.A.C.

Av. Las Camelias N° 877, Interior N° 302,  
Urb. Santa Cruz, San Isidro,  
Lima, Perú.  
Teléfono: 925274051

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **EXCELSIOR 500 SC** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa sobre la división celular (mitosis de los hongos), básicamente sobre los microtúbulos, lo que causa que se detenga el crecimiento de estos patógenos.

• **EXCELSIOR 500 SC** se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

• **EXCELSIOR 500 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO     | PLAGA                          |                                       | DOSIS<br>(mL/Cil - 200 L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|             | Nombre Común                   | Nombre Científico                     |                           |              |              |
| Vid         | "Podredumbre gris / moho gris" | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                       | 7            | 0.3          |
| Aji Páprika | "Podredumbre gris / moho gris" | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                       | 7            | 5            |
| Tomate      | "Podredumbre gris / moho gris" | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                       | 7            | 0.5          |
| Arroz       | "Pyricularia"                  | <i>Pyricularia oryzae</i>             | 300                       | 8            | 2            |
| Pimiento    | "Oidium"                       | <i>Leveillula taurica</i>             | 300                       | 3            | 0.1          |
| Alcachofa   | "Podredumbre gris / moho gris" | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                       | 14           | 0.01         |
| Palto       | "Antracnosis"                  | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | 300                       | 14           | 0.1          |

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

PC: Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**EXCELSIOR 500 SC** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetir la aplicación después de 20 días. Número máximo de aplicaciones: 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

**EXCELSIOR 500SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja



## LIGERAMENTE PELIGROSO

## CUIDADO

