

29.4 cm x 15 cm

51

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO.
- Este producto es de cuidado, no ingerir. Evite respirar nube de aspersión.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas o cualquier otro tipo de alimento tanto de uso humano como de animales domésticos.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla, durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
- Luego de la aplicación, cambiarse de ropa y quitarse los implementos de manipulación y lavarlos por separado.
- Bañarse con abundante agua y jabón después de cada aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosfoglicina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano.
- En caso de ingestión, si es que el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y lavar el área afectada con jabón neutro y abundante agua.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Antídoto: No hay antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 6328482

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate ..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2614 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

www.agrevoperuana.com

Jr. San Sebastián 298,  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 6328482



Formulador: SICHUAN LESHAN FUHUA TONGDA

AGRO-CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Qiaogou Town, Wutongqiao District, 614800 Leshan, Sichuan, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:



NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VOLCANIX 480 SL es un herbicida sistémico, no selectivo, post-emergente, que está especialmente formulado para el control de la mayoría de las malezas anuales, bianuales, perennes; tanto gramíneas como la hoja ancha, leñosas y ciperáceas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores de mochila, o terrestre. Para aplicaciones con equipos de mochila, debe prepararse una premezcla disolviendo el producto en 2 a 3 litros de agua y luego, agregar la premezcla al tanque, luego aplicar mojando uniformemente el follaje, sin que el producto llegue a gotear. Se recomienda utilizar boquillas del tipo abanico plano.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivos       | Plagas              |                      | Dosis (l/Ha) | R.C. (días) | LMR (ppm) |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
|                | Nombre común        | Nombre científico    |              |             |           |
| Espárrago      | Verdolaga           | Portulaca oleracea   | 3.00         | 5           | 0.10      |
|                | Amaranto            | Amaranthus spinosus  |              |             |           |
|                | Capulí cimarrón     | Nicandra physaloides |              |             |           |
|                | Lengua de vaca      | Rumex crispus        |              |             |           |
|                | Hierba de gallinazo | Chenopodium murale   |              |             |           |
|                | Coquito             | Cyperus rotundus     |              |             |           |
| Vid            | Amor seco           | Bidens pilosa        | 3.00         | 5           | 0.50      |
|                | Gramma china        | Sorghum halepense    |              |             |           |
|                | Rabo de zorro       | Setaria verticillata |              |             |           |
|                | Yuyo                | Brassica campestris  |              |             |           |
|                | Verdolaga           | Portulaca oleracea   |              |             |           |
|                | Hierba de gallinazo | Chenopodium murale   |              |             |           |
| Naranja        | Capulí cimarrón     | Nicandra physaloides | 3.00         | 5           | 0.50      |
|                | Coquito             | Cyperus rotundus     |              |             |           |
|                | Pata de gallina     | Eleusine indica      |              |             |           |
|                | Amaranto            | Amaranthus spinosus  |              |             |           |
|                | Lengua de vaca      | Rumex crispus        |              |             |           |
|                | Cerraja             | Sonchus oleraceus    |              |             |           |
| Palto          | Gramma china        | Sorghum halepense    | 2.00         | N.A.        | 0.2       |
|                | Coquito             | Cyperus rotundus     |              |             |           |
|                | Yuyo                | Amaranthus dubius    |              |             |           |
|                | Verdolaga           | Portulaca oleracea   |              |             |           |
|                | Gramma dulce        | Cynodon dactylon     |              |             |           |
|                | Hierba de gallinazo | Chenopodium murale   |              |             |           |
| Caña de Azúcar | Capulí cimarrón     | Nicandra physaloides | 2.00         | 28          | 2         |
|                | Hierba de gallinazo | Chenopodium murale   |              |             |           |
|                | Coquito             | Cyperus rotundus     |              |             |           |

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- **ESPÁRRAGO:** Aplicar al término de la cosecha, previo corte de los turiones para evitar el contacto del producto con el cultivo.
- **VID:** Aplicar en post emergencia sobre el follaje de las malezas presentes cuya altura media debe ser 0.4 a 0.6 m. Evitar el contacto con el cultivo principal
- **NARANJO:** En post emergencia, sobre el follaje de las malezas presentes en el surco de riego o anillos de los frutales.
- **PALTO Y CAÑA DE AZÚCAR:**
- Post emergencia de la maleza con una altura aproximada entre 15 a 20 cm.
- Realizar una aplicación por campaña en cada cultivo recomendado.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con materiales galvanizados y con sustancias alcalinas.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

