

$1,0 \pm 0,3$ $1,0 \pm 0,3$

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

- **Grupo químico: Estrobilurinas / Triazol.**
- En caso de inhalación trasladar al aire libre y quedarse en reposo. Acudir al médico si es necesario. Si no respira, dar respiración artificial y obtenga atención médica tan pronto como sea posible.
- En caso de contacto con la piel retirar con cuidado la ropa contaminada. Lave el área afectada con agua y jabón. Busque atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con agua limpia durante 15 minutos , si usa lentes de contacto retirarlos y continuar enjuagando los ojos y busque atención médica.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca y dar pequeñas cantidades de agua. No provocar el vómito. Mantener al paciente en reposo y solicitar atención médica. No le de nada por la boca a una persona que está semiconsciente o inconsciente.
- No existe antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Peligroso para organismo acuáticos.
 No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Medidas en cm.

FITOFAC[®]

325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Azoxystrobin	200 g/L
Difenoconazole	125 g/L
Aditivi	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2615 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Javier Prado Este N°6210 - Oficina N° 306
La Molina. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Contenido Neto: 20 L

Nº de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.

No. 7 Huanyang East Road.

Jixi County Anhui Province. China.

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

FITOFACITOR® 325 SC es un fungicida formulado a base de los ingredientes activos azoxystrobin y difenoconazole de acción preventiva, curativa y erradicante. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. Se distribuye homogéneamente por todos los tejidos sin acumularse en los bordes de las hojas.

FITOFACITOR® 325 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Iniciar las aplicaciones luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

FITOFACITOR® 325 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecomnas, parihuelas, etc.). Utilizar boquillas de cono hueco o cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ARÁNDANO	Blueberry leaf rust	<i>Thekopsora minima</i>	0.2	-	21	a) 5.0
	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.15-0.2	0.4-0.6		b) 4.0
CEBOLLA	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2-0.3	-	21	a) 1.0 b) 0.1
ESPÁRRAGO	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.2	0.583	100	0.01
GRANADO	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.15-0.2	-	150	a) 0.01 b) 0.1
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.15	-	21	a) 2.0 b) 0.6
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	a) 2.0 b) 3.0

P.C.: Periodo de Carencia a) Azoxystrobin b) Difenconazole **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar máximo una aplicación de **FITOFACITOR® 325 SC** por campaña considerando dos campañas por año y con un intervalo entre aplicaciones de 180 días para espárrago. Para vid y palto considerar 1 aplicación por campaña/año con gasto de agua de 1000 L/ha y pH de 5-6, aplicar de forma foliar y en la etapa de desarrollo del cultivo. Para arándano realizar 1 aplicación por campaña/año con gasto de agua de 600 L/ha y pH de 5-5.5 desde el desarrollo de hojas hasta el inicio de fructificación. Para cebolla y granado realizar 1 aplicación por campaña/año. Aplicar previa evaluación de la plaga o de manera preventiva cuando las condiciones climáticas predisponen el inicio de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: FITOFACTOR® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, en caso que exista duda.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Envase PEAD