

2 cm

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Fenilurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- No existe antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

**En caso de emergencia llamar a:**

**CICOTOX** Telf. : 0800-1-3040 (Atención 24 horas)  
**ESSALUD EN LINEA:** 411-8000 Opción 4  
**AVGUST PERU SAC:** 016522182

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligrosos para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



**V\_nuron<sup>®</sup> 500 SC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Linuron ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 1259 - SENASA**

Titular del Registro:  
**AVGUST PERU SAC**  
 Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.  
 Formulado por:  
 Kinyield Industry Co. Limited  
 Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Mármol Road, Hong Kong, China.

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1L  
 Lote N°:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

30 cm

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**V\_NURON 500 SC** es un herbicida selectivo, sistémico utilizado para el control de malezas (malezas de hoja ancha, gramíneas y algunas malezas perennes), en los cultivos de cebolla, papa y espárragos. Se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	0.5	N.R	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Campanilla morada	<i>Ipomoea purpurea</i>			
Papa	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	0.5-	N.R	0.05
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	0.75		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			
Espárrago	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1-1.5	1	7
	Garrapatilla	<i>Sida spinosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

PC: Período de carencia      L M R : Límite Máximo de Residuos (ppm:partes por millón)  
 N.R: No Relevante.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de **V\_NURON 500 SC** es post-trasplante en el cultivo de cebolla, y post-siembra, antes de la rotación en el cultivo de papa. Se recomienda realizar una sola aplicación por campaña. En el espárrago aplicar después del chapado antes de la cosecha.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina y oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se aplica en el momento y dosis recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

