

35.0 cm

“ LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la copia de esta etiqueta.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CETOX** Telf.: 0800-7-1911  
**ESSALUD EN LÍNEA:** 411-8000 Opción 4  
**AVGUST PERU SAC:** 016522182

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5 m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# Diprid® 350 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Imidacloprid ..... 350 gr/ L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 930- SENASA**

Titular de Registro:  
**AVGUST PERU SAC**  
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.  
Formulado por:  
Kinyield Industry Co. Limited

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 200 L  
N° Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DIPRID 350 SC** es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *Prodioplosis longifila* la "Mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de **DIPRID 350 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

**“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil 200L	L/Ha		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.150-0.200	-	3	0.5
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.200	-	3	0.1
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fiorinae</i>	0.150	-	7	1.0
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	-	1.50	14	1.0

P.C: Periodo de carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

**COMPATIBILIDAD**

**DIPRID 350 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

20.0 cm

