

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto causa irritación a los ojos.
- Evite el contacto con la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzoyl ureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada, con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconciente.
- Nota al Médico, no tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
AVGUST PERU SAC: 016522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Ypsilon® 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lufenuron 50 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 1234 - SENASA

Titular del registro:

AVGUST PERU SAC

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

Changzhou August Agrochem Co., Ltd.
301, Changjiang Road, Binjiang Chemical Industry Zone,
Hi-Tech Development Area, Changzhou, Jiangsu, 213000, China.

Importador y Distribuidor:

avgust
crop protection

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

-Aplicar YPSILON 50 EC en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.

-Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Espárrago	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	0.15 - 0.2	-	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	10	0.02
Tomate	Caballada (Gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15 - 0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.6 - 0.7	7	1

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga, previa evaluación del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis y usos recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

2.0 cm

1.2 cm

1.0 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO
DAÑO

