LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIóN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua, si el paciente está consciente proporcionar uno o dos vasos de agua. Si ocurre vomito espontánea inclinar a la persona y mantenerla boca abajo. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los parpados abiertos durante el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación: Colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
TITULAR DEL REGISTRO: 3638659
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIóN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIóN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
  No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
-

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MYCOFOL

AGENTE DE CONTROL BIOLóGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIóN

Bacillus subtilis.....6.9 g/L
(Equivalente a p/v: 2 x 10⁹ UFC/mL)

Aditivos.....c.p.s.....1L

Reg. No. 077 - SENASA - PBA – ACBM

Titular del Registro:
ALTEO AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Saenz Peña N° 344, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf.: 363-8659

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
REPRESENTACIONES Y PRODUCTOS PARA EL CAMPO RPC SAC
Calle Los Manzanos 649
Urbanización Country Club el Golf
San Isidro, Lima.
Telf.: 205-1111

FORMULADOR:
ALTEO S.A.S.
Parcelación Industrial Palmaseca Manzana J-1
Glorieta Aeropuerto Km 2 vía
Zona Franca Palmaseca.
Celular: (+57) 314 888 0793 / www.alteo.technology
Valle del Cauca – Colombia

CONTENIDO NETO: **4 L**
No de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MYCOFOL es un fungicida biológico formulado con cepas de *Bacillus subtilis* y metabolitos. Su acción se debe a los metabolitos tales como subtilina, bacitracina y toximicina, y enzimas que evitan la formación del hongo previniendo su instalación en el cultivo. Tiene varios mecanismos de acción, lo cual lo hace altamente efectivo para prevenir y controlar a las enfermedades, actúa como una barrera física en la superficie vegetal evitando la adherencia y germinación de los fitopatógenos.

MYCOFOL es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. Las aplicaciones se deben realizar de manera preventiva antes de observa síntomas o cuando las condiciones del ambiente sean favorables para el desarrollo del patógeno en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	P.C	L.M.R
	Nombre científico	Nombre común			
Arroz	*Rhizoctonia solani*	Chupadera fungosa	1.5*	N.A.	N.A.
Banano	*Mycosphaerella fijiensis*	Sigatoka negra	1.5**	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos. **P.C:** Período de Carencia. **N.A.:** No Aplica
*Gasto de agua: Arroz: 250 - 300 L/Ha **Banano: 400 - 600 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIóN
Se puede realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.
Aplicar cuando el cultivo esté en activo crecimiento.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD
"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

PRECAUCIÓN