

# EMABEN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos solubles (SG)

### Composición:

Emamectin Benzoate..... 50 g/kg  
Aditivos ..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 2627-SENASA

### TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,  
Magdalena del Mar. Lima - Perú  
Teléfono: 01-501-1000

### FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG

RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area,

Weifang Shandong 262737 - China

Teléfono: 86-531-88875222 / 88875231

E-mail: rainbowchem@rainbowchem.com



### IMPORTADOR

DROKASA PERÚ S.A

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,

Magdalena del Mar. Lima - Perú

Teléfono: 01-501-1000

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica al suelo para retener el emamectin benzoate y reducir su movilidad, lixiviación hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EMABEN se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en un tercio de agua, se agita bien y completa con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda como máximo una aplicación por campaña cuando se observen los primeros signos de la plaga en el cultivo.

### PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Grupo químico: Avermectina

- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.

#### Nota al médico:

- El producto no tiene antídoto específico.
- Proporcionar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a:

SAMU Telf.: 106.  
DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.  
CETOX Telf.: 0800-71911.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase inutilícelo triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (mg/Kg)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	g/ha		
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	150 - 200	7	0.01
Palto	Perforador de frutos	<i>Argyrotaenia spheropera</i>	80	-	17	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	100	-	20	0.01

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

