



380 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Boscalid: 250 g/kg

Pyraclostrobin: 130 g/kg

Aditivos : c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2628 - SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.

Nanjing 211100 CHINA.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

• Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, ventilados y alejados de alimentos.

• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

• Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

• Ningún envase que haya o quiera para consumo.

• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

• Grupo químico: Boscalid: Carboxamida; Pyraclostrobin: Strobilurina

• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta, por vía oral.

• Si se ingirió no induce el vómito. Realícelo si es necesario por vía beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.

• En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.

• En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

• Si se inhaló: Si aspira, mueva la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

• Antídoto: este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.



TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: (01) 411-3000 (opción 4)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Peligro para organismos acuáticos.

• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.

• Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

• En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OWNER® 380 WG contiene dos ingredientes activos: Boscalid, que pertenece al grupo químico de las Carboxamidas y Pyraclostrobin a una estrobilurina, ambos con

sitios de acción diferentes que se complementan y potencian, reforzando el control simultáneo de enfermedades

El producto es de uso foliar. Pyraclostrobin se absorbe por la planta. Boscalid es absorbido rápidamente por el tejido vegetal moviéndose en forma transláminar y

se distribuye sistemáticamente con el flujo de la savia. Pyraclostrobin tiene acción transláminar, se transloca de

depósitos adheridos a la cera de la cutícula proporcionando resistencia al lavado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar OWNER® 380 WG hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo y considerando una frecuencia entre aplicaciones de 10 días.

Aplicar el producto en programas de rotación de cultivos con diferentes modos de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

OWNER® 380 WG es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas y acaricidas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

OWNER® 380 WG no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	0.6 - 0.8	14	a) 5.0 b) 2.0

P.C.: Periodo de Carencia (a) Boscalid (b) Pyraclostrobin L.M.R.: Límite máximo de residuos

