

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de **CUIDADO** no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Morfolinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: Conducir al paciente hacia un lugar con aire fresco. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: No usar colirio. Buscar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No hay un antídoto específico. Tratar de manera sintomática.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411- 8000 Anexo 4, Infosalud: 0-800-10-828

CICOTOX: 0-800-1-3040, 328-7700

CISPROQUIM: 080-050-847

Sal Biosciences Perú S.A.C.: 942-851-423

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



VALIENTE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición :

Dimethomorph..... 500 g/L

Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N°-SENASA

Titular del Registro, Importador:

SAL BIOSCIENCES PERÚ S.A.C.

Av. Canaval y Moreyra N° 452, Piso 17

San Isidro, Lima - Perú

Formulador:

SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO., LTD.

F9 Building C, Global Finance & News Center, No, A1,

Xuanwumenwai Street, Beijing, China 100052

Teléfono: +86-10-59337480

CONTENIDO NETO: 4 L

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VALIENTE pertenece a las morfolinas, actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomicetos como la racha. Tiene acción translaminar.

VALIENTE se prepara diluyendo la dosis indicada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre el follaje.

Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o atomizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.05

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Aplicar previa evaluación cuando aparezcan síntomas de la enfermedad o condiciones favorables para el desarrollo del hongo.

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña al año. Dosis máxima 0.4 L/Ha.

PERIODOS DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

VALIENTE se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



