

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Morfolinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación: Conducir al paciente hacia un lugar con aire fresco. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: No usar colirio. Buscar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: No hay un antídoto específico. Tratar de manera sintomática.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106  
AGROINTESA PERÚ S.A.C.: (01) 620-5058**

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# VALIENTE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Dimethomorph.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 2637-SENASA**

Titular del Registro: **SAL BIOSCIENCES PERÚ S.A.C.**  
Av. Canaval y Moreyra 542. San Isidro, Lima - Perú



Formulador: **SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO., LTD.**  
F9 Building C, Global Finance & News Center, No, A1,  
Xuanwumenwai Street, Beijing, China 100052  
Teléfono: +86-10-59337480

Importador, Distribuidor: **AGROINTESA PERÚ S.A.C.**  
Av. Mariscal José de la Mar. Urb. Santa Cruz 1120  
(Oficina 606), Miraflores, Lima - Perú Tel.: 5116205058  
Email: [info@agrointesa.com.pe](mailto:info@agrointesa.com.pe)  
[www.agrointesa.com.pe](http://www.agrointesa.com.pe)



**CONTENIDO NETO: 5 L**

**Número de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

VALIENTE pertenece a las morfolinas, actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomicetos como la rancha. Tiene acción translaminar.

VALIENTE se prepara diluyendo la dosis indicada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre el follaje.

Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o atomizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”**

| CULTIVO | PLAGA        |                               | DOSIS | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
|         | Nombre común | Nombre científico             | L/ha  |              |              |
| Papa    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.4   | 7            | 0.05         |

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación cuando aparezcan síntomas de la enfermedad o condiciones favorables para el desarrollo del hongo.

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña al año. Dosis máxima 0.4 L/Ha.

**PERIODOS DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 24 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

VALIENTE se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



