

Transform™



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Spinetoram..... 100 g/kg
Sulfoxaflo..... 300 g/kg
Aditivo c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 2358-SENASA

Titular del Registro **DuPont Perú S.A.C.**

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27. Lima - Perú.

FORMULADO POR:

Gowan Milling LLC bajo especificaciones de
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
EEUU

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Aris Industrial S.A.
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú
Telf.: (51-1) 3365428



Dow AgroSciences



CONTENIDO NETO: 1 Kg

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

97067262 2004

Transform™



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Spinetoram..... 100 g/kg
Sulfoxaflor..... 300 g/kg
Aditivo..... c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 2358-SENASA

Titular del Registro **DuPont Perú S.A.C.**

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27. Lima - Perú.

FORMULADO POR:

Gowan Milling LLC bajo especificaciones de
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
EEUU



Dow AgroSciences

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Aris Industrial S.A.
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú
Telf.: (51-1) 3365428



CONTENIDO NETO: 1 Kg

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

®™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

97067262 2004

**LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN**

Este producto es dañino, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Spinosines y Sulfoxamina.

En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.

En caso de ingestión: No induzca el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos. Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos.

En caso de inhalación: Retirar a la persona contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar al
0800-13040 CICOTOX /
0800 50847 CISPROQUIM /
0801-10200 ESSALUD (Gratuito).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Transform™ es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Transform™** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando.

Aplíquese **Transform™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Kg / ha	P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m)
	Nombre común	Nombre técnico			
Palto	Quereza	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.3	7	*0.3 **0.2
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus ficus</i>	0.3	7	*0.3 **2.0
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	7	*0.3 **2.0

LMR = Límite Máximo de Residuos

PC = Periodo de carencia

* Spinetoram **Sulfoxaflor

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **Transform™** máximo 01 aplicación por campaña, siendo 1 campaña por año.

Aplicar en etapa de floración del cultivo y en presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Transform™ es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



