

350 mm

92 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es dañino, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Spinosines y Sulfoxamina. En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión: No induzca el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, Lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. En caso de inhalación: Retirar a la persona contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847, Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración del cultivo.
No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Transform™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Spinetoram..... 100 g/kg
Sulfoxaflor..... 300 g/kg
Aditivo c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 2358-SENASA

Titular del registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

FORMULADO POR:



Corteva Agriscience LLC,
9930 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, EEUU.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Aris Industrial S.A.
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú Telf.: (51-1) 3365428

CONTENIDO NETO: 1 Kg

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

™ © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Transform™ es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Transform™ agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese Transform™ en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico	Kg / ha	g / 200 L		
Palto	Quereza	<i>Florinia florinae</i>	0.3	-	7	*0.3 **0.15
	Gusano de la canasta	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.20	26.7	7	*0.3 **0.15
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus ficus</i>	0.3	-	7	*0.3 **2.0
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	-	7	*0.3 **2.0
Pimiento	Mosquilla	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.200	100.00	1	**1.5 *0.4

LMR = Límite Máximo de Residuos

PC = Periodo de carencia

* Spinetoram

**Sulfoxaflor

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar Transform™ tanto para el cultivo de Vid como para el cultivo de Palto, 1 aplicación por campaña, siendo 1 campaña al año. Manejo de Resistencia: - Transform™ contiene el ingrediente activo spinetoram y es un insecticida IRAC GRUPO 5. - No se recomienda usar únicamente Transform™ u otros insecticidas del GRUPO 5 para controlar la misma plaga durante toda la temporada. - Evite exponer a generaciones consecutivas de una plaga el mismo modo de acción (MoA) utilizando el enfoque de "ventana de aplicación" que rota productos de diferentes MoA. - Las aplicaciones múltiples (no más de dos aspersiones consecutivas) del mismo MoA del insecticida son aceptables si se usan dentro de la misma ventana de aplicación o generación de la plaga. - Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las plagas. - Transform™ no debe alternarse o ser mezclado con cualquier insecticida al que ya se haya desarrollado resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Transform™ es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

