

Inhibin 25 PM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION:

Diflubenzuron 250 g/kg

Aditivos 750 g/kg

Reg. PQUA N° 142 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto N° 304.

Urbanización Santa Patricia II Etapa

La Molina. Lima - Perú

Teléfonos: (1) 348-1018 / 349-9609

Formulador por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Tel. (86-510)8785 1001



Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERU S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 0.25kg

N° Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado, en su envase original bien cerrado.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACIOS:

- Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Benzoy phenyl urea

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No hay antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. Si la irritación es dermal, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

Teléfonos de emergencia : CICOTOX :328 7700;

ESSALUD:411 8000 opción 4; CISPQUIM : 0800 50847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo, de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INHIBIN 25 PM es un insecticida inhibidor de quitina que interfiere con la formación de la cutícula durante el estado larval de los insectos, dificultando así el proceso de muda.

INHIBIN 25 PM es un insecticida que actúa por ingestión y contacto sobre los estados inmaduros de los insectos, no afectando a los adultos.

INHIBIN 25 PM se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de **INHIBIN 25 PM** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando el volumen de agua de aplicación.

INHIBIN 25 PM puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres, con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

Puede hacerse una segunda aplicación 7 -10 días después de la primera.

Número de aplicaciones por campaña: 2 - 3

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

INHIBIN 25 PM es incompatible con productos de reacción ácida.

FITOTOXICIDAD:

No existe reportes de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones utilizadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico-químicas indicadas en etiqueta y es apto para los fines que recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Por cilindro 200 L (g)	Por ha (kg)		
ALGODONERO	"Gusano perforador de hoja"	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	200	0.4	5	0.05
ESPARRAGO	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	250	---	5	0.05
MAIZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150	0.3	5	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

