

31,2 ± 0,3

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial del producto: ZUXION® 20 LS

Nombre químico: (EZ)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.

Nombre común: IMIDACLOPRID

Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA

Registro PQUA N° 1633 - SENASA

Composición:


Imidacloprid 200 g/L

Aditivos..... c.s.p.1L

Fórmula empírica: C₉H₈ClN₃O₂

Peso molecular: 255.7

Fórmula estructural:



Presentaciones del producto:

120 ml, 250ml, 1L, 20L.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Líquido.
- Color: Amarillo claro.
- Olor: Característico.
- Almacenamiento: **ZUXION® 20 LS** conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental y en su envase original y sellado.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

- LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**
- MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoide.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.
- En caso de contacto cutáneo retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 411 8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o alrededores.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



13,0 ± 0,3

GENERALIDADES

ZUXION® 20 LS es un insecticida de acción sistémica con amplio espectro de acción, pero especialmente efectivo contra insectos masticadores, minadores, chupadores y raspadores.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZUXION® 20 LS se emplea diluido en agua; se sugiere no realizar pre-mezclas. Verter la dosis recomendada en el tanque de aplicación y agitar bien hasta hacer la mezcla homogénea.

MÉTODO DE APLICACIÓN

ZUXION® 20 LS se aplica en aspersión con cualquier equipo convencional terrestre. En las aplicaciones manuales puede utilizarse mochilas a palanca o motor, tecnomas y parihuelas. Utilizar boquillas de cono hueco o cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Asegúrese que el equipo de aplicación se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Dejar un intervalo mínimo de 10 - 12 días entre aplicaciones.
- No aplicar en época de floración.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ml/ 250 L	Drench ml/ 250 L	Gota/Litro		
ALCACHOFA	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	250	-	-	7	0.05
ALGODONERO	"Pulgón verde"	<i>Aphis gossypii</i>	200-250	-	-	14	1.0
ARROZ	"Sogatita"	<i>Tagosodes orizicolus</i>	200	-	-	14	0.05
ARVEJA	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	200	-	-	7	2.0
	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	250	-	-	7	0.05
ESPARRAGO	"Mosca blanca"	<i>Bemisia argentifolii</i>	200	-	-	7	0.05
MANDARINA	"Minador de brotes"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	150-200*	-	-	14	1.0
MELÓN	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	150-200*	-	-	7	0.2
PALTO	"Queresa de palto"	<i>Floricola florinae</i>	150-200*	-	-	7	1.0
PAPA	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	200-250	-	-	7	0.05
PAPRIKA	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	250	-	-	12	0.05
PIQUILLO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	250	-	-	12	0.05
	"Barenador de tallo"	<i>Scolytus ruginosus</i>	250-300	-	-	25	0.03
VID	"Flojera de la vid"	<i>Viteus vitifoliae</i>	200	400	2	25	0.03
	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	200	-	1	25	0.03

LMR: Límite Máximo de Residuo.
* Agregar aceite agrícola al 0.5% en verano.

PC: Periodo de Carenza.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

ZUXION® 20 LS es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con materiales alcalinos y abonos foliares. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

ZUXION® 20 LS no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ZUXION® 20 LS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)



Titular de Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Envase: COEX

L. SILVESTRE
T. LAVADO

B. TOXICOLÓGICA
T. LAVADO

TEXTO

PANTONE 343 C

PANTONE 293 C

P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE