

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Durante la preparación de la mezcla y la aplicación usar máscara, guantes protectores y ropa adecuada; no comer, fumar ni beber; mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación. Terminada la labor lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. Usar los envases originales y cerrarlos herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

- RyzUp es ligeramente tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareo, vómitos, etc., llamar de inmediato al médico más cercano.
  - En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico. Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
  - En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuague los con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Lávese la piel con abundante agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada antes de volver a usarla. Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
  - Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
  - Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.
- DL50 Oral aguda > 5 000 mg/kg  
DL50 Dermal aguda > 2 000 mg/kg

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

# RyzUp®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:  
Ácido giberélico . . . . . 4% p/p\*  
Aditivos . . . . . 96% p/p

\*Equivalente a 32 g de i.a. por litro de producto comercial  
Reg. PBUA No. 016-SENASA

Distribuido por:

 **Bayer CropScience**  
Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
San Isidro. Lima - Perú  
Telf. 2113800

Formulado por:

 **VALENT BIOSCIENCES**  
Valent BioSciences LLC  
1910 Innovation Way, Suite 100  
Libertyville, IL 60048  
Estados Unidos  
1-800-323-9597

**Titular del Registro:**  
SMTM Perú SAC  
Av. República de Panamá 3531  
Of. 1203 - Lima 27  
T: 511-421-4811

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



INFLAMABLE

**Contenido Neto:**  
**2 x 5 Litros**

Lote N°:  
Fecha de:  
Formulación:  
Fecha de:  
Vencimiento:

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- RyzUp es un regulador de crecimiento, su ingrediente activo es el ácido giberélico o GA3 sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas e influye en su crecimiento y desarrollo.
- RyzUp aumenta la producción, promueve un mejor cuajado de frutos, uniformiza cosechas, retarda la maduración, interrumpe la latencia de tubérculos, semillas y bulbos, induce a la floración.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar de acuerdo a las indicaciones dadas para cada cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** El ingreso al área tratada puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No aplicar con productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivos               | Dosis ml/cil | Dosis (%) | Objetivos y momento de aplicación                                                                                          | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Alfalfa                | 50-100       | —         | Mayor crecimiento y producción. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo.                                         | 14         | 0.15        |
| Café                   | 50-100       | —         | Uniformizar floración. Aplicar cuando los brotes están hinchando o a la apertura de las primeras flores.                   |            |             |
| Naranja                | 50-100       | —         | Uniformizar cosechas y retardar maduración. Aplicar antes del cambio de color de los frutos. No usar en naranja valencia.  |            |             |
| Limonero               |              |           |                                                                                                                            |            |             |
| Papa                   | 5-25         | —         | Interrompe latencia de tubérculos y estimula brotamiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos.              |            |             |
| Tomate                 | 50-100       | —         | Logrará un mejor cuajado de frutos.                                                                                        |            |             |
| Vid                    | 125-200      | —         | Mayor crecimiento de granos. Las aplicaciones se realizarán según las variedades. Recomendaciones técnicas (ver folleto).  |            |             |
| Pepino, Melón, Zapallo | 50-100       | —         | Aumentar la producción. Aplicar al inicio de la floración y 21 días antes de la cosecha.                                   |            |             |
| Té                     | 50-100       | —         | Aumentar la producción de hojas. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo.                                        |            |             |
| Banano                 | —            | 4.63      | Para prolongar en post cosecha la vida verde del banano, aplicar con una aspersora manual a la corona y las manos o gajos. |            |             |

\*PC = Período de Carencia (días) \*\*LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A                  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Valent BioSciences |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prepared by        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MOTT GRAPHICS      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| LIST NO.           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 05370-31-01        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| COMMODITY NO.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 04-9617/R5         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| LABEL EDITOR       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C Kelly            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DATE               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 02-11-20           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NON-VARNISH AREA   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25" x 0.75"      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| COLOR SEPARATIONS  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PANTONE 032        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PANTONE 347        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PANTONE 348        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PANTONE 368        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| BLACK              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

List No. 05370-31-01  
04-9617/R5

® Marca registrada de Valent BioSciences LLC, U.S.A.



## PRECAUCIÓN

