KRAKATOA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/Kg
Cymoxanil	80 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2641 - SENASA



TITULAR DEL REGISTRO: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A Urb. Santa Patricia II Etapa La Molina, Lima, Perú Teléfono: (01) 499-7831

FORMULADO POR: POINT AGRO CHINA LMTD

Rm 1206 Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangvin, Jiangsu China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Contenido Neto: 40 Kg

Número de Lote : Fecha de Formulación : Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

®Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó aqua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
- ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiese y bañese con abundante agua y INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cymoxanil. Cyanoacetamide Oxime Mancozeb: Ditiocarbamatos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante aqua v iabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante aqua fresca KRAKATOA puede aplicarse en cualquier etapa fenológica por 15 minutos.
- En caso de ingestión, No inducir al vómito a una persona inconsciente. favorables al patógeno. Realizar un máximo de 2 solicitar ayuda, llamar al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y ventilado, brindar respiración artificial y llevar al paciente al PERIODO DE REINGRESO:
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: (01) 328-7700 ESSALUD EN LINEA: (01) 411-8000 opción 4 INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abeias
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de no menos de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para lugar destinado por las autoridades para este fin.

KRAKATOA es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva v curativa.

Para la aplicación del producto, se debe llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada y completar con agua, mezclar uniformemente y aplicar sobre el área de la planta a tratar.

Realizar la aplicación con un equipo de aspersión manual o mecánico, en optimas condiciones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

del cultivo y cuando las condiciones climáticas sean aplicaciones por campaña.

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

KRAKATOA es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción

FITOTOXICIDAD:

KRAKATOA no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

0111771/0	PLAGAS		DOSIS		PC	LMR (ppm)	
CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	g/200L	(días)	Mancozeb	Cymoxanil
Papa	"Rancha,Hielo fungoso"	Phytophthora infestans	1 - 1.5	500	7	0.2	0.05
Tomate	"Rancha,Hielo fungoso"	Phytophthora infestans	1.5 - 2	500	3	2.5	0.2
	"Mancha negra"	Alternaria solani	1 - 2	500	3	2.5	0.2
Pimiento	"Mancha negra"	Alternaria solani	1 - 1.25	500	7	5	0.05

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

















