

SANIRANCHA®

720 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Cymoxanil 80 g/kg
Mancozeb 640 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: + 51 -1 - 222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importado y distribuido por:
SANIVEG PERU S.A.C.
Av. San Jenaro 235 - Urb. Industrial Puente Piedra -
Puente Piedra - Lima - Perú.
Teléfono: + 51 - 1 - 016371269
Celular: + 51 - 959292596

N° Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

GENERIC
your exclusive agrochemical partner

SANIVEG PERU
SAC

CONTENIDO NETO: 100 G.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO”**

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Este producto es de CUIDADO. No ingerir”

“Evite el contacto con la piel y la ropa”

“Causa irritación moderada a los ojos”

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”

“Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado”

“Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados”

“No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,
bebidas ni forrajes”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al
área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación”

“Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese
con abundante agua y jabón”

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para
conservar alimentos o agua para consumo”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 0801-10200

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Cil 200 L (Kg)	Ha (Kg)		
CEBOLLA	MILDIU	<i>Peronospora destructora</i>	0.5	1.0	7	0.05* 1.5**
PAPA	RANCHA	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5	0.73	15	0.01* 0.2**

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

*Cymoxanil

**Mancozeb

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del
cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

