

EXPANSION 350 SC 200L 28,7x15 cm.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajajes.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

**Teléfonos de Emergencia  
CICOTOX: (01) 328-7700**

**ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4 / INAP: (01) 499-7831**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces u otros organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas de napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

# EXPANSION<sup>350</sup> SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Imidacloprid ..... 350g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° -SENASA**

**Titular del Registro:** INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.  
Av. Javier Prado N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa,  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831



**Formulado por:** NANTONG DADING CHEMICAL CO., LTD.  
Chemical Industry Zone Yangkou,  
Rudong, Nantong,  
China

**Importado y Distribuido por:** INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.  
Av. Javier Prado N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa,  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Contenido Neto: 200 L**

Fecha de Form:  
Fecha de Venc:  
N° de Lote:

**NO INFLAMABLE**



**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**EXPANSION 350 SC** es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

Por su efecto sistémico **EXPANSION 350 SC** está destinado para el control de plagas como *Prodiplosis longifila* en el cultivo de espárrago, pimiento y tomate, y *Bemisia tabaci* en el cultivo de pimiento.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL / 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ESPARRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	7	0.05
	"Mosca Blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200	21	1
PIMIENTO	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	1
	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.5

\*En base a un volumen de 400 Litros de agua.

PC: Periodo de Carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomiendan 3 aplicaciones por campaña como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

Debido a su especificidad se recomienda aplicar solo con un surfactante sin mezcla con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD**

**EXPANSION 350 SC** no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



● Banda - Yellow C

● Marca - Pantone Rojo Warm Red C

● Pantone 7481 C

Logo de INAP

