

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo si se ingiere, absorbido por la piel o si se inhala.
- Evite respirar polvo, vapor, niebla o gas. Evite el contacto con los ojos, la piel.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- Almacene lejos de materiales incompatibles tales como agentes oxidantes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. Obtenga ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. Consulte con el médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Si la respiración es irregular o se detiene, aplique respiración artificial. Buscar atención médica.

**Teléfonos de emergencia: Llamar a ESSALUD: 411 8000 ,
CISPROQUIM: 080-050-847, CAISAC: 01- 253-6444**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- DERRIX es un fungicida sistémico que inhibe la biosíntesis de la quitina en la pared celular de los hongos, evitando la germinación y esporulación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo, deteniendo la expansión de lesiones. Por ser sistémico es absorbido por hojas, tallos y raíces de la planta.
- Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una solución uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con equipos convencionales de aspersión foliar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.25	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar DERRIX máximo dos (02) aplicaciones por campaña al año para el cultivo de vid, cuando el suelo esté en capacidad de campo. La aplicación debe realizarse al inicio de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

DERRIX es compatible con otros fungicidas utilizados para el control de la enfermedad, a excepción de productos fuertemente alcalinos. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

DERRIX no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

DERRIX

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables - WG

Composición:

Polyoxin-B 500 g/kg

Aditivos: c.s.p. 1 kg

Nº SENASA - PBA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Nanjing Rhonquim Co., Ltd.

Address: No.26 Majia Street, Nanjing

Tel: 86-25-83303203

Fax: 86-25-83303203

Contenido Neto: 1kg

Lote Nº:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

