

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Mibelya® se debe aplicar a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda alternar con otros productos de diferente mecanismo de acción como estrategia de manejo anti-resistencia. En arroz para el control de <i>Sarocladium</i>, debido a que este patógeno infecta la panícula desde cuando ésta se encuentra en inicio de formación, dentro de las vainas, la aplicación se debe hacer en forma preventiva desde el punto de algodon. Para el control de <i>Bipolaris oryzae</i>, realizar la aplicación en punto de algodon (formación del primordio floral). Para el control de <i>Rhizoctonia</i> y <i>Gaeumannomyces</i> aplicar en pleno macollamiento y punto de algodon. En papa y pimiento aplicar en floración, con un gasto de agua no menor de 400 L/Ha. Realizar máximo una aplicación por campaña al año en los cultivos de arroz y pimiento.	COMPATIBILIDAD: Se debe evitar aplicar Mibelya® con productos de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos. FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE EQUIPOS DE APLICACIÓN: Para la limpieza del equipo es importante que el operador utilice equipo de protección personal durante el proceso y que siga las siguientes recomendaciones de lavado: Llene el tanque del equipo con agua, agite bien el contenido. Aplique la mezcla de agua en un terreno baldío, zona de lavado de equipos, lejos de personas (especialmente niños) construcciones, cultivos, animales y fuentes de agua. Repita el proceso al menos 2 veces más. Remueva los filtros y boquillas, límpielos sumergiéndolos en un recipiente con agua. Nunca sopre los filtros ni boquillas. Limpie el exterior del equipo. Destine un trapo a una esponja solo para este propósito. RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.
PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación. MODO DE ACCIÓN: Mibelya® es una mezcla de mefenitruconazol y fluxapyroxad, posee acción sistémica, y transaminar con propiedades protectoras y curativas. MECANISMO DE ACCIÓN: - Mefenitruconazol pertenece al grupo de los triazoles, sub grupo isopropanol-azoles y, por lo tanto, es un inhibidor de C-14 demetilasa del citocromo P450 (CYP5 1). El agotamiento de ergosterol y la acumulación de 14x-metil esteroleos no funcionales da como resultado la inhibición del crecimiento y la disrupción de la membrana celular. Grupo FRAC 3. - Fluxapyroxad inhibe la respiración celular de las mitocondrias interfiriendo en el transporte de electrones del complejo II, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos, actúa sobre todos los estadios de desarrollo y reproducción del hongo, como inhibidor de la germinación de las esporas, desarrollo y penetración de los tubos germinativos, crecimiento del micelio y esporulación. Grupo FRAC 7.	

ETIQUETA PARA USO EXTERNO DEL SENASA