

08.05.2020

BENAXIL[®] 73

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benalaxyl	80.00 g/kg
Mancozeb	650.00 g/kg
Etilentiorea (ETU)	0.38 g/kg
Aditivos	270.00 g/kg

PQUA N° 22-SENASA

Titular Del Registro: SERFI S.A.

Formulado y Distribuido por:



Av. República de Panamá N° 2577
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono: 710-4068

Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 200 g



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar el contenido en otros envases ni reutilizarlos.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto no puede ser usado en presencia de personas que mantengan tratamiento para epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problema de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ditiocarbamato, Aclalanine

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CETOX: Tel.: 0800 71911

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

- En caso de ingestión provocar el vómito lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- En caso de intoxicación no dar de beber leche ni bebidas alcohólicas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Es peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No aplicar a menos de 2 metros de fuentes de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.50	28	1
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.50	28	1
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	1.00 - 2.00	28	1
Zapallo	Mildíu	<i>Pseudoperonospora cubensi</i>	1.25 - 1.50	28	1
Páprika	Pudrición tallo y frutos	<i>Phytophthora capsici</i>	1.00	15	1
Vid	Mildíu	<i>Plasmopara viticola</i>	1.0 - 1.5	28	1

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Limite máximo de residuos (parte por millón)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Es un fungicida de actividad sistémica y de contacto con acción preventiva y curativa para el control de "chromistas". Una característica de BENAXIL 73 es su capacidad de actuar al interior de los tejidos de los diversos órganos de los vegetales al ser absorbido por las yemas, hojas, ramas herbáceas y raíces de las plantas. Su comportamiento endotérmico le permite actuar en el interior de los tejidos de las plantas, además de actuar contra los patógenos en la superficie de los órganos de las plantas. No usar en ambientes cerrados como invernaderos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene de agua el recipiente hasta un tercio del mismo y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Po último complete con agua el recipiente y continúe agitando.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede aplicarse cuando las condiciones medio ambientales favorezcan la infección de las plantas por el patógeno. Se puede aplicar hasta dos veces por campaña has ta 4 veces por año y con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

La aplicación se realiza con equipos terrestres como pulverizadores de palanca o aquellas acopladas a tractores. El gasto promedio es de 600 litros por hectárea en los cultivos recomendados.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

