

MEDIDA 1L

27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es TOXICO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- ¡Cuidado! Contiene metanol. Puede ser fatal o causar ceguera si es ingerido. Puede ser fatal si se absorbe a través de la piel o si es inhalado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbamato
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Si es ingerido: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar antes los lentes de contacto si los hubiera.
- Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106 - CISPROSQUM: 080-050-847 Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Vydate® L

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA NEMATÓCIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Oxamyl..... 240 g/L
Aditivo..... c.s.p. 1 L

Reg PQUA No. 2654-SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú

Formulado por:
E.I du Pont de Nemours and Company
-Dirección planta de formulación 1:
2509 Rocky Ford Road, Valdosta,
GA 31601, EEUU
-Dirección planta de formulación 2:
931 Platte Road, Greenville,
Mississippi 38701, EEUU

Importado y Distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERU
Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe



Fecha de formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 litro

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Vydate® L es un insecticida nematocida de propiedades sistémicas. Puede ser aplicado al follaje o al suelo, dependiendo del tipo de plaga a ser controlado.

Preparación de la mezcla: Llene el tanque hasta 1/4 o la mitad de su capacidad. Empiece a agitar (agitación mecánica o hidráulica), añada la cantidad de Vydate® L requerida y llene el tanque con agua. Continúe agitando hasta iniciar la aplicación.

Mecanismo de acción: Extiende su control en organismos dañinos mediante un mecanismo neurotóxico los efectos tóxicos son claramente rápidos resultado en la parálisis y muerte de los artrópodos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Algodón	Gusano perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	2.5 - 3.0	21	0.01
	Arrebatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	2.0		
	Chinche escudo	<i>Euschistus</i> sp	2.0-2.5		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidrobensis</i>	2.5	7	0.01
	Mosquilla del brote	<i>Prodioplosis</i> sp	2.4-3.0		
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suricallus</i>	1.4-2.0		

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Ajo	Nematodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.0-2.5	Almácigo: A la siembra y 30 días después. Trasplante: 15, 35 y 55 días después.	21	0.02
	Frijol	Nematodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.0		
Tomate	Nematodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.0-2.5	Almácigo: A la siembra y 30 días después. Trasplante: 10, 20, 40 y 60 días después.	3	0.01
	Papa	Nematodo del Nudo	<i>Meloidogyne</i> sp	2.5		
Papa	Nematodo del Quiste	<i>Globodera</i> sp	2.5	20, 45 y 75 días pos-emergencia		
	Nematodo falso nodulador	<i>Heterodera pallida</i> <i>Nacobbus</i> sp				
Pimiento	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.5	Al inicio de la campaña con el primer riego.	N.A.	0.01
Ajo	Nematodo del nudo	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2.5	Desinfección de semilla. Aplicaciones foliares.	N.A.	0.01

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar Vydate® L una aplicación por campaña para Algodón y dos aplicaciones por campaña para Papa como máximo y una frecuencia entre aplicaciones de 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO: Ingrese a la área tratada 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Evite mezclar Vydate® L con caldo Bordalés, sulfuro de calcio y fertilizantes líquidos altamente alcalinos para no perder la acción insecticida.

FITOTOXICIDAD: Vydate® L no es fitotóxico a los cultivos si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



14.0 centimeters

2.10 centimeters

0.2 centimeters

0.2 centimeters