

“LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, con los ojos y con la ropa.
- Usar obligatoriamente guantes, botas de jebe, overol, anteojos de protección y tapabocas o mascarilla, esto durante la aplicación del producto y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No fumar, ni comer, ni beber durante la manipulación del producto y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y bajo sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección de viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15 a 20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente al médico, suministre un vaso de agua al paciente. No inducir al vómito.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CORPORACION GREEN VALLEY SAC: 044 407781

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelve el envase triple lavado al centro de copio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

MIDAPRID

350SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Imidacloprid.....350 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Registro PQUA N° 1098 - SENASA

Titular de registro:

CORPORACIÓN GREEN VALLEY

Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector

Lima - Lima - San Martín de Porres

Teléfono: 953560949



Contigo en tu campo

Formulado por:

KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED

Dirección: Unit 905, Workingberg

Commercial Building 41-47,

Marble Road, Hong Kong, China.

Importado y distribuido por:

CORPORACIÓN GREEN VALLEY

Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202,

Urb. Z.I. Pro 9no Sector

Lima - Lima - San Martín de Porres

Teléfono: 953560949

Contenido Neto: 200 L

Nro. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MIDAPRID 350 SC es un insecticida sistémico, traslaminar para ser aplicado en el control de la *Prodidiplosis longifolia* la mosquilla de los brotes. Actúa por ingestión y contacto.

Preparación de mezcla: Vierta la cantidad **MIDAPRID 350 SC** de en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	0.150 - 0.200	3	0.50
Arándano	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.200	3	5

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD:

MIDAPRID 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es compatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

MIDAPRID 350 SC no es Fitotóxico en los cultivos si se emplea la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

