

WIRTIX

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Lambdacyhalothrin50 g/L.
Aditivosc.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Importador y distribuidor :



Fabricante y formulador :

**AGRO-CARE CHEMICAL
INDUSTRY GROUP LIMITED**
343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province,
Telef: 0086-510-82791479
P.R. CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir. Tóxico por ingestión e inhalación.
- Es irritante a los ojos y a la piel. Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar

conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Piretroides

- En caso de intoxicación oral o inhalatoria, llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por 15 minutos.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398 - **ESSALUD** 0801-10200 (emergencia 24 horas) - **ESSALUD EN LINEA:** 411-8000 - **CISPROQUIM:** 0-800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las

- autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **WIRTIX** es un insecticida de contacto e ingestión de rápida acción, y larga

residualidad no es persistente por que se degrada muy rápidamente en las plantas.

- **WIRTIX** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido luego aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo, haciendo un intervalo entre aplicación de 7 a 14 días,

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L.	L/Ha.		
Pimiento	"Gusano del fruto"	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	15	0.1

L.M.R. = Límite máximo de residuos
P.C. = Período de carencia

cuando se observa la presencia de la plaga en campo.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las zonas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

WIRTIX es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina como el azufre y otros cúpricos. Se recomienda regar el campo de cultivo antes de la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD:

WIRTIX no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponder a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

