

Vibrel®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Giberelinas 0.040 g/L
Auxinas 0.035 g/L
Citoquinina 0.085 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. RCP N° - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR
Y DISTRIBUIDOR:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304 Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina, Lima
Teléfono: 348-1018

FORMULADOR:
Point Agro-China Limited
Rm 1205 Kaisa Plaza
1091 East Renmin Road Jiangyin, Jiangsu,
China
Teléfono: +86 (0) 510 80618096

CONTENIDO NETO: 20 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar la ingestión, inhalación, y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Después de la aplicación quitarse la ropa contaminada y lavar todas las zonas expuestas con agua y jabón.
- Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales.
- Almacenar en áreas bien ventiladas, frescas, secas y oscuras, alejado de temperaturas altas y sol fuerte.
- Almacenar separado de los alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: Sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado, mantenerla abrigada y en reposo. Buscar de inmediato asistencia médica.
- Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo afectadas.
- Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Buscar asistencia médica.
- Ingestión: Beber mucha agua o leche, siempre y cuando el afectado se encuentre consciente provoque el vómito y busque asistencia médica.
- Transportar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Nunca suministre nada por la boca cuando este inconsciente y mantenerlo acostado de lado.

Nota al médico

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Teléfonos de emergencia: **CICOTOX: 328 7700**
ESSALUD: 411 8000 opción 4
POINT ANDINA S.A.: 348 1018

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En casos de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase autorizado.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **VIBREL** es un regulador de crecimiento de plantas que se aplica en el follaje para estimular y restablecer la fisiología normal de la planta dando como resultados el incremento de los rendimientos y mejorando también la calidad de la cosecha.
- Contiene citoquininas, auxinas y giberelinas, sustancias biológicas naturales. El contenido de giberelinas provoca el crecimiento celular de tejidos y órganos; las auxinas promueven la formación de raíces laterales y adventicias así también como la formación de frutos; las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los frutos por división celular.
- Colocar agua en el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad.
- En otro recipiente diluya la cantidad necesaria del producto.
- Verter esta solución al tanque de mezcla y completar con agua hasta la capacidad total del tanque.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio del macollamiento, hasta dos aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas y sustancias afines. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla en el tanque.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
Arroz	Inicio de macollamiento	0.5	21	0.1 * N.A ** 0.01 ***

* Auxina ** Giberelina *** Citoquinina

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos (parte por millón) N.A.: No aplica

