

23.40 cm

12.30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: IMIDAZOLE<sup>TM</sup> + TRIAZOLE<sup>TM</sup>
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / NEXXT S.A.C.: 3261910

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros, arroyos o arroyos con los residuos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Pestañe una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Flumet

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

Composición:

Prochloraz.....267 g/L
Tebuconazole.....133 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2663 - SENASA

Titular del Registro: NEXXT S.A.C.

Importado y distribuido por:
Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156.
Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis, Lima-Perú
Tel.: 3261910

Formulado por:
Jiangsu Inter-China Group Corporation
Inter - China Building N° 116
Dingmaoquiao Road Zhenjiang,
Jiangsu, China

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FLUMET es un poderoso fungicida sistémico que previene y cura a "Sarocladium" (Sarocladium oryzae) en el cultivo de arroz, ofreciendo un mayor rendimiento y calidad de la cosecha. FLUMET con sus dos ingredientes activos: Prochloraz y Tebuconazole, tiene acción prolongada, preventiva, curativa, y antisporulante. Prochloraz es un fungicida con acción de contacto y translinamar que protege la superficie y la capa superior de las hojas. El Tebuconazole tiene acción sistémica e inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos, y al traslocarse de forma acropetal (hacia arriba) en las plantas, protege los nuevos brotes. Aplicar FLUMET con equipos convencionales. FLUMET se aplica en forma de aspersión foliar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, de forma preventiva. Para la preparación de la mezcla, vacíe el cilindro o el tanque de aplicación, con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto volviendo a llenar lentamente. Completar luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Table with 6 columns: CULTIVO, PLAGA, DOSIS, P.C., L.M.R. Row 1: Arroz, Sarocladium, Sarocladium oryzae, 0.4, 35, 1.5.

L.M.R. = Límite máximo de residuos
Prochloraz
Tebuconazole

P.C. = Período de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

FLUMET se aplica una vez por temporada de cultivo. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD:

FLUMET es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común, pero no es compatible con productos de marcada reacción alcalina (por ejemplo, el Polisulfuro de calcio). Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

FLUMET no es fitotóxico a la dosis y cultivos recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

