

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# PORTERO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Azoxystrobin ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 839 - SENASA

**Títular de Registro:**

**DVA PERU SAC**  
Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602  
Magdalena del Mar - Lima  
Teléfono: 511-6449380 / 953730063



**Formulador:**

**IPROCHEM COMPANY LIMITED**  
35f, Guomao Business Mansion, 3005 Nandhu Rd.  
Luohu district Shenzhen, China  
Teléf.: 86-755-823553001 Fax: 86-755-8225900

**Importador y Distribuidor:**

**PROCITRUS**  
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú  
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido neto: 100 g**

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

DENOMINACIÓN: ETIQUETA: PORTERO  
N° DE COLORES: 2  
N° DE PANTONES:  AMARILLO Yellow C  
 NEGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación o ingestión llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la Etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PORTERO®** es un fungicida empleado en aplicaciones foliares, con cualquier equipo de aplicación terrestre, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Mandarina	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.025 - 0.037	-	0	15
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	-	14	3
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.12	-	2	0.01
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.30 - 0.35	1	5

P.C.: Período de carencia  
Gasto de agua en arándano: 600 L/Ha

LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año.

Para el cultivo de arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña al año, considerando un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación.



**DENOMINACIÓN:** ETIQUETA: PORTERO  
**N° DE COLORES:** 2  
**N° DE PANTONES:**  AMARILLO Yellow C  
 NEGRO