

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PORTERO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 839 - SENASA

Títular de Registro:

DVA PERU SAC
Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063



Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED
35f, Guomao Business Mansion, 3005 Nandhu Rd.
Luohu district Shenzhen, China
Teléf.: 86-755-823553001 Fax: 86-755-8225900

Importador y Distribuidor:

DVA PERU SAC
Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 100 g

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

DENOMINACIÓN: ETIQUETA: PORTERO
N° DE COLORES: 2
N° DE PANTONES:  AMARILLO Yellow C
 NEGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la Etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PORTERO® es un fungicida empleado en aplicaciones foliares, con cualquier equipo de aplicación terrestre, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Mandarina	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.025 - 0.037	-	0	15
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	-	14	3
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.12	-	2	0.01
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.30 - 0.35	1	5

P.C.: Período de carencia
Gasto de agua en arándano: 600 L/Ha

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año.

Para el cultivo de arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña al año, considerando un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación.



DENOMINACIÓN: ETIQUETA: PORTERO
N° DE COLORES: 2
N° DE PANTONES:  AMARILLO Yellow C
 NEGRO