

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PORTERO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 839 - SENASA

Titular de Registro:

DVA PERU SAC

Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063



Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED

35f, Guomao Business Mansion, 3005 Nandhu Rd.
Luohu district Shenzhen, China.
Teléfonos: 86-755-823553001 Fax: 86-755-8225900

Importador y Distribuidor:

PROCITRUS

Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 KG

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

DENOMINACIÓN: ETIQUETA: PORTERO
N° DE COLORES: 2
N° DE PANTONES: AMARILLO Yellow C
NEGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Strobirulin
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no esta consciente.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PORTERO® es un fungicida empleado en aplicaciones foliares, con cualquier equipo de aplicación terrestre, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

PORTERO® se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Mandarina	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.025-0.037	-	0	15
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.30-0.35	1	5

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
Gasto de agua en arándano: 600 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

- Para el cultivo de mandarina, realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año.
- Para el cultivo de arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña al año, considerando un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PORTERO® es compatible con productos de reacción alcalina, oxidantes y reductores.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado en las dosis y el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



DENOMINACIÓN: ETIQUETA: PORTERO
Nº DE COLORES: 2
Nº DE PANTONES: AMARILLO Yellow C
 NEGRO