BENZEMAX 5% SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES SG

Composición:

Emamectin benzoato.....50gr./ kg.
Aditivos.....c.s.p.1 kg.

Reg. PQUA Nº 1094 - SENASA

Titular del Registro:
CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC
Calle B. N° 141. Int. 202.
Pro 9no sector, San Martin de Porres
Teléfono: 044 407781

Formulador:
BETA CHEMICALS
Rm. 707, Bik. A. Kingsound Center, No. 116,
Zizhuyuan Road.Beijing 100097, China.

Importado y distribuido por:
omnicrop
Una agricultura diferente
CONSORCIO OMNICROP SAC
RUC: 20559660796
Mza. Ñ lote. 7 urb. Natasha Alta
La Libertad - Trujillo - Trujillo

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 100 g
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BENZEMAX 5% SG es un insecticida con actividad por contacto e ingestión, recomendado para el control de lepidópteros en el cultivo de pimiento, espárrago y palto.
Para la preparación, llenar el tanque con la mitad de agua a aplicar, remover el agua y simultáneamente echar la cantidad de **BENZEMAX 5% SG** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.
BENZEMAX 5% SG, debe ser aplicado con un volumen de agua que se asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.
Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg./200L	Kg./Ha.		
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	*Chloridea virescens*	0.09 - 0.100		3	0.01
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Chloridea virescens*		0.175	7	0.01
Palto	Gusano del cesto	*Oiketicus kirbyi*	0.07	0.42	14	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	*Chloridea virescens*	0.10	0.30	7	0.01

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
BENZEMAX 5% SG puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estados larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar el producto de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO