

18x 24

**ROZEL****PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

Cymoxanil.....80 g/Kg.  
 Mancozeb.....640 g/Kg.  
 Aditivos.....c.s.p. 1 kg.

**PQUA N° XXXX-SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO : CHEMIVAL S.A.**  
**CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.**

Importador y distribuidor :



CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.  
 Calle Las Turquezas Mz. F Lt. 29  
 Urb. San Eulogio 2da. Etapa - Comas  
 Teléfono: 5240647 Lima - Perú

Fabricante y formulador :

**AGRO-CARE CHEMICAL**  
**INDUSTRY GROUP LIMITED**

343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province,  
 Telef: 0086-510-82791479  
 P.R. CHINA

Fecha de formulación :  
 Fecha de vencimiento :  
 Lote N° :  
 Contenido neto : 1 Kg.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

18x 24

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### "Mantengase bajo llave fuera del alcance de los niños"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Tóxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Peligroso si es inhalado.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No se transporte ni almacene junto a producto alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, provoque el vómito, siempre que el paciente esté consciente.
- No tiene antidotos específicos.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:  
CICOTOX 0-800-1-3040  
ESSALUD 472-2300 (Lima)

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No re-utilizar los envases.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **ROZEL** es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple, que previene y cura una diversidad de enfermedades fungosas del Orden Peronosporales.
- **ROZEL** es un antiesporulante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta.
- **ROZEL** tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir cuando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO:

- 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

- Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

#### FITO TOXICIDAD:

- No es fito tóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.
- Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

- El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGA                      |                        | DOSIS (KG)         |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                    |
|---------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------------------|
|         | Nombre común               | Nombre científico      | Por 200 L. de agua | Por Ha.   |                |                                    |
| Papa    | "Rancha" ó "Hielo fungoso" | Phytophthora infestans | 0.5                | 1.5 - 2.0 | 14             | 0.05 (Cymoxanil)<br>0.3 (Mancozeb) |

L.M.R. = Limite Maximo de Residuos | P.C.: Periodo de Carencia

