

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Evitar contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrrole.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411- 8000 Anexo 4, Infosalud: 0-800-10-828

CICOTOX: 0-800-1-3040, 328-7700

Sal Biosciences Perú S.A.C.: 942851423

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RUNKUP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICION :

Chlorfenapyr.....240 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N°-SENASA

Titular del Registro, Importador:

SAL BIOSCIENCES PERÚ S.A.C.

Av. Canaval y Moreyra 542.

San Isidro, Lima - Perú

Formulador:

SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO., LTD.

F9 Building C, Global Finance & News Center, No, A1,

Xuanwumenwai Street, Beijing, China 100052

Teléfono: +86-10-59337480

CONTENIDO NETO: 20 L

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RUNKUP, es un insecticida sistémico y traslaminar que actúa por contacto e ingestión, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa de los procesos metabólicos del insecto, lo que lleva al desgaste energético y posterior muerte.

RUNKUP, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o atomizadora que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha		
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	45	0.02

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

- Las aplicaciones de **RUNKUP** se deberán realizar como parte de un Manejo Integrado de Plagas y luego de una evaluación de la población y daños causados por la plaga al cultivo.
- Máximo 1 aplicación/campaña/año, y un máximo de 0.2 L/Ha.
- En caso se requiera nuevas aplicaciones, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- **NO APLICAR EN ÉPOCA DE FLORACIÓN.**

PERIODOS DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

RUNKUP puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes o sustancias oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado en los cultivos y a las dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



