

# Boxer<sup>®</sup> 25% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición**

Diflubenzuron ..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

**Reg. PQUA N° 161-SENASA**

**Titular de Registro: Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.**



Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa,  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por: Point International Ltd.**

42 St. Margarets Grove  
Twickenham TW1 1JG  
United Kingdom

**Importado y**

**Distribuido por: Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 Kg**

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado, en su envase original bien cerrado.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Benzoyphenylurea
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. Si la irritación es dermal, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

### Teléfonos de Emergencia:

**CICOTOX: (01) 328-7700**  
**ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

#### VACÍOS:

- Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo, de al menos 5 metros.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BOXER 25% PM** es un insecticida inhibidor de quitina que interfiere con la formación de la cutícula durante el estado larval de los insectos, dificultando así el proceso de muda.

**BOXER 25% PM** actúa por ingestión y contacto sobre los estados inmaduros de los insectos, no afectando a los adultos.

**BOXER 25% PM** se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de **BOXER 25% PM** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando el volumen de agua de aplicación.

**BOXER 25% PM** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres, con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

Número de aplicaciones por campaña: 2 - 3.

Puede hacerse una segunda aplicación 7 - 10 días después de la primera.

### PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD:

**BOXER 25% PM** es incompatible con productos de reacción ácida.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta. No existen reportes de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones utilizadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO          | PLAGA                       |                                 | DOSIS  |       | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|
|                  | Nombre común                | Nombre científico               | g/200L | Kg/ha |                |                 |
| <b>ALGODÓN</b>   | "Gusano perforador de hoja" | <i>Bucculatrix thurberiella</i> | 200    | 0.4   | 5              | 0.05            |
| <b>ESPÁRRAGO</b> | "Gusano perforador"         | <i>Heliothis virescens</i>      | 250    | ---   | 5              | 0.05            |
| <b>MAÍZ</b>      | "Cogollero"                 | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 150    | 0.3   | 5              | 0.05            |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

