

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Boxer® 25% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Diflubenzuron.....250 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 161 - SENASA



**Titular de registro :**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Cal. Los Tulipanes 147 Int. 701B,  
Santiago de Surco, Lima – Perú  
Teléfono +51 (01) 499-7831

**Formulado por: POINT AGRO-CHINA Ltd**  
Rm1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin  
Road Jiangying, Jiangsu, 214400, China

**Importado y distribuido por:**  
**HEROW CHEMICALS S.A.C.**  
AV. Tacna Nro. 1770 P.J.  
Hector Aurich Soto  
Ferreñafe, Lambayeque  
Teléfono: +51 979280030



**Contenido Neto: 1Kg**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado, en su envase original bien cerrado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo químico: Benzoyphenylurea.**
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. Si la irritación es dermal, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo, de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BOXER 25% PM** es un insecticida inhibidor de quitina que interfiere con la formación de la cutícula durante el estado larval de los insectos, dificultando así el proceso de muda.

**BOXER 25% PM** es un insecticida que actúa por ingestión y contacto sobre los estados inmaduros de los insectos, no afectando a los adultos.

**BOXER 25% PM** se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de **BOXER 25% PM** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando el volumen de agua de aplicación.

**BOXER 25% PM** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres, con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.  
Número de aplicaciones por campaña: 2 - 3  
Puede hacerse una segunda aplicación 7 - 10 días después de la primera.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**BOXER 25% PM** es incompatible con productos de reacción ácida.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	Kg/ha		
Algodón	Gusano perforador	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	200	0.4	5	0.05
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	250	-	5	0.05
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150	0.3	5	0.05

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

