

28,3 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,5 ± 0,2

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto es irritante a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Clorofenólicos.**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua. Si la persona puede beber, darle un vaso con agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial y solicitar atención médica inmediata.
- Nota al médico: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**ESSALUD EN LINEA: 0801-10200**  
**SICSAC: 01-3634668**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Brazador®

## 720 SL

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

#### Composición:

2,4-D, en forma de Sal amina ..... 720 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 2656 - SENASA**

#### Titular del Registro:

**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**  
 Calle Manuel Amat y Juniet 502, oficina 201  
 Surco, Lima - Perú  
 Telf.: (511) 363-4668



#### Formulado por:

**JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.**  
 11Renmin West Road, Zhangjiagang,  
 Jiangsu 215600 China.

#### Importado y Distribuido por:

**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**

#### Contenido Neto: 1 L

N° Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BRAZADOR 720 SL** es un herbicida sistémico y selectivo. Este tipo de herbicidas son rápidamente absorbidos a través de las raíces y follaje, y luego traslocados por el xilema y el floema. La traslocación ocurre con acumulación principal en las regiones meristemáticas de brotes y raíces.

**BRAZADOR 720 SL** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Los tratamientos de post-emergencia deben hacerse de forma dirigida, evitando el mínimo contacto del producto con el cultivo.

**BRAZADOR 720 SL** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO        | PLAGA              |                                                   | DOSIS   |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|
|                | Nombre Común       | Nombre Científico                                 | L/200L  | L/ha |                |                 |
| CAÑA DE AZÚCAR | "Verdolaga"        | <i>Portulaca oleracea</i>                         | 1.0-1.5 | 2-3  | 7              | 0.05            |
|                | "Aguaymanto"       | <i>Physalis peruviana</i>                         |         |      |                |                 |
|                | "Amor seco"        | <i>Bidens pilosa</i>                              |         |      |                |                 |
|                | "Cadillo"          | <i>Cenchrus echinatus</i>                         |         |      |                |                 |
|                | "Lechera"          | <i>Euphorbia heterophylla</i>                     |         |      |                |                 |
|                | "Cardo santo"      | <i>Argemone mexicana</i>                          |         |      |                |                 |
|                | "Hierba gallinazo" | <i>Chenopodium murale</i>                         |         |      |                |                 |
|                | "Higuera"          | <i>Ricinus communis</i>                           |         |      |                |                 |
|                | "Lengua de vaca"   | <i>Rumex crispus</i>                              |         |      |                |                 |
|                | "Chamico"          | <i>Datura stramonium</i>                          |         |      |                |                 |
|                | "Moco de pavo"     | <i>Echinocloa crus-galli</i>                      |         |      |                |                 |
|                | "Coquito"          | <i>Cyperus rotundus</i>                           |         |      |                |                 |
|                | "Malva"            | <i>Malvastrum</i>                                 |         |      |                |                 |
|                | "Malva silvestre"  | <i>coromandelianum</i><br><i>Malva parviflora</i> |         |      |                |                 |

P.C.: Período de Carenacia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En caña de azúcar, se recomienda 1 aplicación por campaña. Los mejores resultados se obtienen pulverizando las malezas desde el estado de germinación hasta el estado de plántulas de 2-4 hojas, cuando están creciendo activamente en fuerte competencia con el cultivo.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos. Evitar la mezcla con agentes oxidantes fuertes.

#### FITOTOXICIDAD

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo las dosis recomendadas en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



15,0 ± 0,3

2,3