

18.0 cm

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Brazador®

720 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**
**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**
**Composición:**

2,4-D, en forma de Sal amina ..... 720 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2656 - SENASA

**Titular del Registro, Importador y****Distribuidor:****SILVESTRE INTERNATIONAL  
COMPANY S.A.C.**

Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A

Z.I. El Agustino. Lima - Perú.

Telf.: (01) 644-9297

**Formulado por:****JIANGSU GOLDEN CHEMICAL  
CO., LTD.**11 Renmin West Road, Zhangjiagang,  
Jiangsu 215600. China.**Contenido Neto: 20L**

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**
**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**
**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto es irritante a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Clorofenólicos.**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua. Si la persona puede beber, darle un vaso con agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial y solicitar atención médica inmediata.
- Nota al médico: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

SICSAC: (01) 644-9297

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BRAZADOR® 720 SL** es un herbicida sistémico y selectivo. Este tipo de herbicidas son rápidamente absorbidos a través de las raíces y follaje, y luego trasladados por el xilema y el floema. La traslocación ocurre con acumulación principal en las regiones meristemáticas de brotes y raíces.

**BRAZADOR® 720 SL** se emplea diluido en agua; preparar una premezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Los tratamientos de post-emergencia deben hacerse de forma dirigida, evitando el mínimo contacto del producto con el cultivo. **BRAZADOR® 720 SL** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO           | PLAGA                             |                               | DOSIS   |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|
|                   | Nombre Común                      | Nombre Científico             | L/200L  | L/ha |                |                 |
| CAÑA DE AZÚCAR    | "Verdolaga"                       | <i>Portulaca oleracea</i>     | 1.0-1.5 | 2-3  | 7              | 0.05            |
|                   | "Aguaymanto"                      | <i>Physalis peruviana</i>     |         |      |                |                 |
|                   | "Amor seco"                       | <i>Bidens pilosa</i>          |         |      |                |                 |
|                   | "Cadillo"                         | <i>Cenchrus echinatus</i>     |         |      |                |                 |
|                   | "Lechera"                         | <i>Euphorbia heterophylla</i> |         |      |                |                 |
|                   | "Cardo santo"                     | <i>Argemone mexicana</i>      |         |      |                |                 |
|                   | "Hierba gallinazo"                | <i>Chenopodium murale</i>     |         |      |                |                 |
|                   | "Higuerilla"                      | <i>Cimicifuga racemosa</i>    |         |      |                |                 |
|                   | "Lengua de vaca"                  | <i>Rumex crispus</i>          |         |      |                |                 |
|                   | "Chamico"                         | <i>Datura stramonium</i>      |         |      |                |                 |
|                   | "Moco de pavo"                    | <i>Echinochloa crus-galli</i> |         |      |                |                 |
|                   | "Coquito"                         | <i>Cyperus rotundus</i>       |         |      |                |                 |
| "Malva"           | <i>Malvastrum coromandelianum</i> |                               |         |      |                |                 |
| "Malva silvestre" | <i>Malva parviflora</i>           |                               |         |      |                |                 |

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** En caña de azúcar, se recomienda 1 aplicación por campaña. Los mejores resultados se obtienen pulverizando las malezas desde el estado de germinación hasta el estado de plántulas de 2-4 hojas, cuando están creciendo activamente en fuerte competencia con el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos. Evitar la mezcla con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



3.0 cm