

$14,5 \pm 0,3$

2,2

Brazador[®]
720 SL
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOL
HERBICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Soluble (SL)

Registro PQUA N° 2656 - SENASA



Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRAZADOR 720 SL es un herbicida sistémico y selectivo. Este tipo de herbicidas son rápidamente absorbidos a través de las raíces y foliaje, y luego trasladados por el xilema y el floema. La traslocación ocurre con acumulación principal en las regiones meristemáticas de brotes y raíces.

BRAZADOR 720 SL se produce diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a ser aplicado. El volumen de agua de aplicación debe ser suficiente para cubrir el área de aplicación. Los tratamientos de post-emergencia deben hacerse de forma dirigida, evitando el mínimo contacto del producto con el cultivo.

BRAZADOR 720 SL puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parhuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegúrese que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

BRAZADOR 720 SL puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegúrese que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
CAÑA DE AZÚCAR	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0-1.5	2-3	7	0.05
	"Aguaymanto"	<i>Physalis peruviana</i>				
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>				
	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	"Lechera"	<i>Euphorbia heterophylla</i>				
	"Cardo santo"	<i>Argemone mexicana</i>				
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
	"Higuierilla"	<i>Ricinus communis</i>				
	"Lengua de vaca"	<i>Rumex crispus</i>				
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>				
	"Moco de pavo"	<i>Echinocloa crus-galli</i>				
	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>				
	"Malva"	<i>Malvastrum coromandelianum</i>				
	"Malva silvestre"	<i>Malva parviflora</i>				

P.C.: Periodo de Carenzia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En caña de azúcar, se recomienda 1 aplicación por campaña. Los mejores resultados se obtienen pulverizando las malezas desde el estado de germinación hasta el estado de plántulas de 2-4 hojas, cuando están creciendo activamente en fuerte competencia con el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos. Evitar la mezcla con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.