

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# **HojANCH<sup>®</sup>**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN:**

2,4-D dimethylamine salt..... 864 g/L

Aditivos..... csp 1L

**Reg. PQUA N° 2562 - SENASA**



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**

Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ate. Lima-Perú.  
Telef.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

**Shandong Weifang**

**Rainbow Chemical Co., Ltd**

6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre,  
Shunhua Road 750#,  
Jinan, Shandong, China.

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 20 L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es tóxico si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Alkylchlorophenoxy. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión: No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. NO INDUCIR AL VÓMITO sin supervisión médica. En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón, mínimo por 15 minutos. En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre, mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario. En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera. **Nota al médico:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para los peces, plantas acuáticas y semi-acuáticas. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**HOJANCHA** es un herbicida hormonal-sistémico, selectivo y post-emergente, que controla malezas de hoja ancha. **HOJANCHA** Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, provisto con boquillas de abanico. Pulverizar uniformemente sobre el follaje de las malezas tiernas o en desarrollo (2-10 cm de altura) en suelos con suficiente humedad.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 – 500 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar **HOJANCHA**, una sola aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para todos los cultivos.

**Caña de azúcar:** Se puede usar en "plantadas" y "socas". **Maíz:** Aplicar sobre las malezas tiernas, evitando mojar el "cogollo". **Arroz, trigo y cebada:** Aplicar sobre las malezas tiernas desde el "macollaje" del cultivo hasta el inicio de "encañado" (antes del "espigado").

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de herbicidas de uso común.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos recomendados a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada



**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO            | MALEZA              |                             | DOSIS   |                | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
|                    | NOMBRE<br>COMÚN     | NOMBRE<br>CIENTÍFICO        | L/ha    | L/cil<br>200 L |                |                 |
| ARROZ              | "Campanilla morada" | <i>Ipomoea purpurea</i>     | 1,5 - 2 | 0,75 - 1       | 15             | 0,05            |
| TRIGO              | "Yuyo"              | <i>Amaranthus dubius</i>    | 1,5 - 2 | 0,75 - 1       | 15             | 0,5             |
|                    | "Verdolaga"         | <i>Portulaca oleracea</i>   |         |                |                |                 |
| MAIZ               | "Yuyo"              | <i>Amaranthus dubius</i>    | 1,5 - 2 | 0,75 - 1       | 7              | 0,05            |
|                    | "Verdolaga"         | <i>Portulaca oleracea</i>   |         |                |                |                 |
|                    | "Amor Seco"         | <i>Bidens pilosa</i>        |         |                |                |                 |
| CEBADA             | "Amor Seco"         | <i>Bidens pilosa</i>        | 1,5 - 2 | 0,75 - 1       | 15             | 0,5             |
|                    | "Lengua de vaca"    | <i>Rumex crispus</i>        |         |                |                |                 |
| PASTURAS GRAMINEAS | "Capulí"            | <i>Nicandra physaloides</i> | 3 - 5   | 1,5 - 2,5      | 15             | 400             |
|                    | "Alfalfa"           | <i>Melilotus indicus</i>    |         |                |                |                 |
| CAÑA DE AZÚCAR     | "Lengua de vaca"    | <i>Rumex crispus</i>        | 3 - 4   | 1,5 - 2        | 15             | 0,05            |
| ÁREAS INDUSTRIALES | "Higuierilla"       | <i>Ricinus communis</i>     | 3 - 5   | 1,5 - 2,5      | N.A            | N.A.            |

P.C. = Periodo de carencia / L.M.R = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica

