

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos Químicos : Triazoles
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconciente. Si el paciente está conciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo la asistencia de un médico.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado. Administrar oxígeno o respiración artificial si es necesario. Llamar al médico o a un centro de información toxicológica.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia al menos durante 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua.

Nota al medico

Antídoto : No se dispone de antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA : • SAMU: 106

• FARM CROP S.A.C.: +51 959205427

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase..



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DINOFARM®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole.....250 g/L.
 Aditivos.....c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° 2675-SENASA

Titular del registro: FARM CROP S.A.C.



Importador y Distribuidor:

FARM CROP S.A.C.
 Urb. Prolongación Benavides
 Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202 -
 Santiago de Surco - Lima, Perú.
 Teléfono: +51 959205427.

Formulado por:

MAC Gmbh
 Alte Landstrasse 15 D-88138
 Sigmarszell Alemania
 E-Mail: info@macgmbh.de

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 500ml

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOFARM® es un fungicida sistémico que pertenece al grupo de los triazoles. Es absorbido por las hojas, actúa en los hongos patógenos por interferencia de la biosíntesis del ergosterol, dando lugar al crecimiento anormal y eventual muerte del hongo. Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
 - Aplicar DINOFARM en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor o por sistema de riego tecnificado.
 - Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
 - El pH preferencial del agua para la aplicación del Difenconazole es 5.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		DOSIS (L/Cil de 200 L.)	P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.10	7	0.05

LMR = Limite Maximo de Residuos

PC = Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar al inicio de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para la aparición de la infección así como la rotación con otros fungicidas de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de la resistencia. Realizar un máximo de 1 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



ETIQUETA PARA PRODUCTO SENASA