

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DINOFARM[®]

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIBLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole.....250 g/L.

Aditivos.....c.s.p. 1 L.

PQA N° 2675-SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:

FARM CROP S.A.C.



Urb. Prolongación Benavides Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202 -
Santiago de Surco - Lima, Perú.
Teléfono: +51 959205427.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100 ml.

Fecha de vencimiento:

Formulado por:

MAC GmbH

Alte Landstrasse 15 D-88138

Sigmarszell Alemania

E-Mail: info@macgmbh.de

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos Químicos : Triazoles
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con sobrantes del producto



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOFARM es absorbido por las hojas, actúa en los hongos patógenos por interferencia de la biosíntesis del ergosterol, dando lugar al crecimiento anormal y eventual muerte del hongo. Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 1 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

FITOTOXICIDAD

DINOFARM es un producto quelatado, por lo tanto no es fitotóxico pero usado en dosis mayores a lo indicado puede causar fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/Cil 200 l.)	P. C (días)	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.10	7	0.05

LMR = Limite Maximo de Residuos | PC = Periodo de Carencia

