DINOFARM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole..... 250 g/L.

Aditivos..... c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° 2675-SENASA

Titular de Registro, Importador y distribuidor:
FARM CROP S.A.C.
RUC: 20602552498
Calle Los Acantos 167, Urb. Los Recaudadores,
Ate, Lima - LIMA

Formulado por: **MAC GmbH**
Alte Landstrasse 15 D-88138
Sigmarszell Alemania
E-Mail: info@macgmbh.de

MAC-GMBH
Agricultural Products - Chemicals

F. de Formulación:
N° de lote:
Cont. Neto: 250 mL
F. de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

-Este producto es de cuidado. No ingerir.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupos Químicos : Triazoles
-En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado.
-En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos.
-En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ECONOMÍA SEGURIDAD
TRIPLE LAVADO
AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los deshechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOFARM es absorbido por las hojas, actúa en los hongos patógenos por interferencia de la biosíntesis del ergosterol, dando lugar al crecimiento anormal y eventual muerte del hongo.
Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros sintomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 1 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

FITOTOXICIDAD

DINOFARM es un producto quelatado, por lo tanto no es fitotóxico pero usado en dosis mayores a lo indicado puede causar fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las caracteristicas fisico-quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/Cil 200 l.)	P.C (dias)	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	Oidium	*Leveillula taurica*	0.10	7	0.05

LMR = Limite Maximo de Residuos | PC = Periodo de Carencia