

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Propamocarb hydrochloride	722 g/L
Aditivos csp	1L

PQUA N° 2677 – SENASA

TITULAR DEL

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo N° 401 Of. 610.
Santiago de Surco. Lima- Perú.
Teléfono: 511 713-9960
E-mail:
rainbowchem@rainbowchem.com

FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development
Area, Weifang Shandong 262737 -
China.
Teléfono: 86-531-88875222 / 88875231

IMPORTADOR:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso
9, Magdalena del Mar. Lima -
Perú

Lote N°:

Fecha de Formulación:**Fecha de Vencimiento:**

Contenido Neto: 4L



SHITOR es un fungicida de acción sistémica, que controla algunos Oomycetos como *Pseudoperonospora* en el cultivo de zapallo.

Preparación de la mezcla y aplicación:

- Hacer una premezcla hasta lograr una solución del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- La aplicación puede ser realizada por diversos equipos de aplicación como mochila de palanca, moto pulverizadoras, pulverizadoras neumáticas accionadas por tractor entre otras.
- La absorción de **SHITOR** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ 200L	L/ ha		
Zapallo	"Mildiú"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.5	1.0	8	5

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

SHITOR es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

SHITOR no es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



® Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

