

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Manzate<sup>®</sup> 200 D

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb.....800 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA No 1568-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.  
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200



Formulador:

UPL LIMITED  
Uniphos House, MadhuPark, 11th Road, khar (West)  
Mumbai (Bombay) 400 052, India Tel. 91-22-2646 8000  
Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

Importado y distribuido por:

FARMEX S.A.  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7, San Isidro, Lima 27-Perú  
Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410  
www.farmex.com.pe



Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dithiocarbamate
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- **Nota al médico:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106 / Teléf. del titular: (01) 5137200  
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**Manzate® 200D** es un fungicida agrícola de contacto que actúa preventivamente. Inhibe la germinación de las esporas al afectar el metabolismo de lípidos, la respiración y producción de ATP.

Llenar el tanque de 1/4 a la mitad con agua, añadir la cantidad requerida de Manzate® 200D y mezclar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Los intervalos de aplicación van de 5 a 10 días dependiendo de la presencia de la enfermedad y las condiciones medio ambientales. Se recomienda iniciar las aplicaciones en forma preventiva, un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Ingreso al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a la dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO         | ENFERMEDAD                    |                                                           | Dosis g/cil         | PC* (días) | LMR (ppm)                              |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------|
|                 | Nombre Común                  | Nombre Técnico                                            |                     |            |                                        |
| Algodón         | Mancha Negra                  | <i>Alternaria tenuis</i>                                  | 400-500             | 7          | 0.5 <sup>(1)</sup>                     |
| Tomate          | Hielo o racha<br>Mancha negra | <i>Phytophthora infestans</i><br><i>Alternaria solani</i> | 400-500             | 7          | 4 <sup>(1)</sup>                       |
| Papa            | Hielo o racha<br>Mancha negra | <i>Phytophthora infestans</i><br><i>Alternaria solani</i> | 400-500             | 14         | 0.2 <sup>(2)</sup>                     |
| Cebolla         | Mildíu                        | <i>Peronospora destructor</i>                             | 400-500             | 7          | 0.5 <sup>(2)</sup>                     |
| Melón<br>Sandía | Mildíu                        | <i>Peronospora cubensis</i>                               | 400-500             | 7          | 0.5 <sup>(2)</sup><br>1 <sup>(2)</sup> |
| Vid             | Podredumbre gris              | <i>Botrytis cinerea</i>                                   | 400-500             | 7          | 0.5 <sup>(2)</sup>                     |
| Maíz            | Helminthosporiosis            | <i>Helminthosporium turcicum</i>                          | 400-500             | 7          | 0.1 <sup>(1)</sup>                     |
| Lechuga         | Mildíu                        | <i>Bremia lactucae</i>                                    | 400-500             | 7          | 10 <sup>(2)</sup>                      |
| Arroz           | Mancha carmelita              | <i>Helminthosporium oryzae</i>                            | 2-3 g/kg de semilla | 7          | N.D                                    |

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm); \*Período de Carencia: Intervalo entre la última aplicación y la cosecha (días); N.D: No Disponible.

(1)TOLERANCIA EN ppm (Valores obtenidos de EPA-Estados Unidos) (2)CODEX

