

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Azure DF®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Azufre ..... 800 g/kg  
Aditivos .....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 2681- SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:  
**SML LIMITED**  
604/605,349 Business Point  
Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai, India.  
Teléfono: +91-22-4345 2222  
Fax: +91-22-43452245 / 2682 3716

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 kg

N° de lote:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con los alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Conservar en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar ropa protectora durante la aplicación: guantes, botas, gafas y máscara. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fungicida inorgánico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No dar nada a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400., CISPROQUIM: 080-050-847.**
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas, no aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**AZURE DF®** es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción contra oidiosis o mancha blanca en muchos cultivos. También tiene efecto acaricida contra ácaros fitopatógenos como el ácaro del tostado en los cítricos y el ácaro hialino que afecta a muchos cultivos.

Sistemas de Preparación y Aplicación  
**AZURE DF®** es una formulación de gránulos dispersables que no libera polvo, eliminando los riesgos de inhalación e irritación. Para preparar la mezcla llene el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue directamente la dosis indicada y complete con agua hasta llenar el tanque, manteniendo la mezcla en agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
- Aplicar de manera preventiva cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de plagas.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: AZURE DF®** es compatible con la mayoría de plaguicidas, pero por razones de fitotoxicidad debe evitarse mezclarse con aceites.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO                | ENFERMEDAD/PLAGA  |                                  | DOSIS (kg/cil) | P.C. (días) | L.M.R. (p.p.m.) |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
|                        | Nombre común      | Nombre científico                |                |             |                 |
| Algodonero             | Oidiosis          | <i>Erysiphe malachrae</i>        | 1.0            | 5           | N.A.            |
| Ají                    | Ácaro hialino     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.75           | 5           | N.A.            |
| Arroz                  | Ácaro del vaneo   | <i>Steneotarsonemus spinki</i>   | 1.0            | 35          | N.A.            |
| <i>Capsicum annuum</i> | Oidium            | <i>Leveillula taurica</i>        | 1.0 - 2.0      | 5           | N.A.            |
| Mandarina              | Ácaro del tostado | <i>Phyllocoptruta oleivora</i>   | 0.75           | 5           | N.A.            |
| Mango                  | Oidiosis          | <i>Oidium mangiferae</i>         | 1.0            | 5           | N.A.            |
| Melocotonero           | Oidiosis          | <i>Podosphaera leucotricha</i>   | 0.5            | 5           | N.A.            |
|                        | Araña bimaclada   | <i>Tetranychus cinnabarinus</i>  | 0.5            | 5           | N.A.            |
| Palto                  | Ácaro             | <i>Oligonychus punicae</i>       | 1.0            | 5           | N.A.            |
| Vid                    | Oidiosis          | <i>Erysiphe necator</i>          | 0.5            | 5           | N.A.            |

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

N.A.: No aplica.

